Bastian Werner

Fotografieren mit Wind und Wetter

Wetter verstehen und spektakulär fotografieren!

Bastian Werner

Fotografieren mit Wind und Wetter **Wetter verstehen und spektakulär fotografieren!**

356 Seiten, gebunden, 39,90 Euro
ISBN 978-3-8362-7258-2

www.rheinwerk-verlag.de/4969

MILCHSTRASSE UND STERNENHIMMEL

Die Bildsensoren in den Kameras werden immer besser und ermöglichen immer höhere ISO-Werte bei guter Qualität. Dadurch wird es leichter, mit der Kamera die für das menschliche Auge kaum sichtbaren Details an unserem Nachthimmel zu fotografieren und so das vermeintlich Unsichtbare sichtbar zu machen. Faszinierende neue Motive bereichern unsere Fotografie, vor allem die Landschaftsfotografie profitiert von der Möglichkeit, die Milchstraße abzulichten. Der Fotograf hat so einen weiteren, höchst interessanten Hintergrund für seine Landschaftsaufnahmen. Musste man früher noch bei Nacht einpacken, wenn das Licht verschwand, so packt man die Kamera heute gezielt aus, um bei Nacht Aufnahmen des Sternenhimmels zu machen.

Besonders das »Galaktische Zentrum«, der hellste Teil der Milchstraße, ist für Landschaftsfotografen sehr interessant. Allgemein ist es unter Fotografen vereinfachend als »die Milchstraße« bekannt und so verwende ich hier auch den Begriff. Das ist astronomisch nicht völlig korrekt, aber für die Betrachtungen in diesem Buch ausreichend.

5.1 Die optimalen Bedingungen

Das Hauptaugenmerk der typischen, auf Aufnahmen mit dem Ultraweitwinkelobjektiv ausgerichteten Landschaftsfotografie liegt auf der Milchstraße an sich, seltener auf dem umgebenden Sternenhimmel.

Zeit und Ort für die optimale Fotografie

Da sich unser Planet nicht im Zentrum der Milchstraße befindet, sondern am äußeren Rand, sehen wir das auf den meisten Fotografien dominante Zentrum der Milchstraße (siehe Abbildung 5.1) nicht zu jeder **Jahreszeit**. Im Winter hat die Erdkugel eine andere Neigung als im Sommer. Aus diesem Grund ist die Milchstraße während der Wintermonate in Mitteleuropa nicht zu sehen. Mit Beginn des Frühlings wird das Zentrum der Milchstraße bei Nacht allmählich immer deutlicher sichtbar. Am höchsten steht die Milchstraße in der Nacht zur Sommersonnenwende an unserem Nachthimmel, denn das Zentrum der Milchstraße nimmt wie jeder Stern und auch die Sonne die gleiche jahreszeitlich schwankende Zugbahn an unserem Himmel. Am tiefsten steht die Milchstraße dementsprechend in der Nacht zur Wintersonnenwende.

Der Beobachtungszeitraum der Milchstraße, bezogen auf Mitteleuropa und alle Orte gleicher geografischer Breite auf der Nordhalbkugel, ist deshalb begrenzt auf **Anfang April bis Ende Oktober**. In den Monaten davor und danach ist das Zentrum der Milchstraße an unserem Himmel nicht zu sehen.

Es sei dazugesagt, dass man in unseren Breiten das Zentrum nur zum Teil sehen kann. In der Abbildung auf der ersten Seite des Kapitels sehen Sie quasi eine Hälfte der Milchstraße. Da sich das Zentrum der Milchstraße von Mitteleuropa aus gesehen immer in Richtung Süden befindet, sollten Sie sich dementsprechend auf der Erdoberfläche nach Süden bewegen – umso besser können Sie es sehen. Folgerichtig kann man die Milchstraße auf der Südhalbkugel so gut sehen, da das Zentrum hoch

oben am Nachthimmel ist. Wenn Sie einmal eine Foto-reise in südlichere Gefilde antreten, sollten Sie daher unbedingt einplanen, die Milchstraße zu fotografieren.

Nicht nur die generelle Sichtbarkeit der Milchstraße ist von der Jahreszeit abhängig, sondern auch, **in welcher Richtung** sie am Nachthimmel sichtbar ist. Bedenken Sie dabei bitte immer:

- Zu Beginn des Jahres sieht man die Milchstraße im Südosten.
- Im Sommer befindet sie sich genau im Süden.
- Im Herbst befindet sie sich im Südwesten.

Weiterhin steht das Sternenband nicht immer in gleicher Form bzw. im gleichen **Winkel** am Nachthimmel. In Abbildung 5.2 sehen Sie eine Aufnahme von Anfang April. Zu dieser Zeit im Jahr steht die Milchstraße mit einem Winkel von etwa 45 Grad zum Horizont am Nachthimmel. Die Milchstraße richtet sich allmählich bis zum Hochsommer auf, sodass sie etwa **Mitte Juli** genau senkrecht am Nachthimmel steht und so vom Horizont des Südhimmels bis in den Zenit reicht. Diese senkrechte Position behält die Milchstraße dann bis Ende Oktober bei. Im Laufe des Jahres ändert sich zudem die **Uhrzeit**, zu der die Milchstraße sichtbar ist. Genau wie Sonne und Mond gibt es quasi einen Aufgang und einen Untergang der Milchstraße am Himmel.

- **Anfang April** sieht man die Milchstraße in der ersten Nachthälfte gar nicht, erst in der zweiten Nachthälfte erscheint sie am Osthimmel. Bevor die Milchstraße jedoch hoch am Himmel steht, geht die Sonne wieder auf, sodass die Milchstraße dann nicht mehr zu sehen ist.
- Im **Hochsommer** ist die Milchstraße bereits nach Sonnenuntergang zu sehen. Hier steht sie gegen Mitternacht am höchsten am Himmel und ist dann bis zum Sonnenaufgang zu sehen.

» 5.1 Zentrum der Milchstraße am Südhimmel im Frühsommer

15 mm | f4,5 | 30s | ISO 8000 | Raw | Stativ

- Im **Herbst** hingegen wird der Höchststand der Milchstraße vor Sonnenuntergang erreicht, sodass man die Milchstraße nur einige Stunden nach Sonnenuntergang sieht, ehe sie im Südwesten versinkt und in der zweiten Nachthälfte gar nicht mehr zu sehen ist.
- In den **Wintermonaten** befindet sich die Milchstraße bei Tageslicht am Himmel, geht quasi gleich mit der Sonne auf und unter, weshalb man sie dann naturgemäß nicht sehen kann.

« 5.2 Milchstraße Anfang April mit
einer 45-Grad-Neigung zum Horizont
15 mm | f5,6 | 200s | ISO 1600 | Raw | Stativ,
Fotomontage aus Vordergrund ohne Nachfüh-
rung und Milchstraße mit Nachführung

Wenn Sie die Milchstraße fotografieren wollen, sollten Sie deshalb die Uhrzeiten ihres Auf- und Untergangs beachten. Tabelle 5.1 gibt Ihnen zu den relevanten Monaten bezogen auf Mitteleuropa einen ungefähren Zeitraum an, von wann bis wann Sie die Milchstraße beobachten können. Die Grafik in Abbildung 5.3 zeigt Ihnen die Himmelsrichtung an, in der die Milchstraße während des in Tabelle 5.1 angegebenen Zeitraums zu finden ist.

⌘ 5.3 Sichtbarkeit des Milchstraßenzentrums nach Jahreszeit und Himmelsrichtung. Da die Milchstraße während der Nacht wandert, bezieht sich der angegebene Winkelbereich auf eine Nacht im Bezugsmonat.

Monat	Aufgang/Beginn der Sichtbarkeit	Untergang/Ende der Sichtbarkeit
April	01Z	Morgendämmerung
Mai	23Z	Morgendämmerung
Juni	Abenddämmerung	Morgendämmerung
Juli	Abenddämmerung	Morgendämmerung
August	Abenddämmerung	Morgendämmerung
September	Abenddämmerung	02Z
Oktober	Abenddämmerung	23Z

Mond und Sternenhimmel

Wenn Sie nun die Milchstraße fotografieren möchten, ist neben den Wolken der Mond Ihr größter Gegner. Theoretisch könnten Sie nämlich in den relevanten Monaten ohne Wolken in jeder Nacht die Milchstraße fotografieren, wäre da nicht das störende Mondlicht. Der feine Leuchtstreifen der Milchstraße in Abbildung 5.1 und Abbildung 5.2 besitzt nur eine sehr geringe Leuchtkraft, weshalb Sie ihn überhaupt nur durch eine lange Belichtungszeit sichtbar machen können. Wenn nun der Mond am Himmel steht, erhellt sein Licht die Atmosphäre. So wird der Nachthimmel heller, Sie können nur noch die hellsten Sterne am Himmel sehen, und auch die Leuchtkraft der Milchstraße ist geringer als die durch den Mond erhellte Atmosphäre.

Sie können deshalb die Milchstraße nicht fotografieren, wenn sich zeitgleich der Mond am Himmel befindet. Es steht daher in jedem Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Tagen zur Verfügung, an denen **Neumond** herrscht und Sie daher die Milchstraße fotografieren können. Ich empfehle Ihnen, sich den 29,5-Tage-Rhythmus des Mondes einzuprägen, denn so können Sie die Phasen mit Neumond ohne Weiteres abschätzen und müssen nicht immer erneut recherchieren. Andernfalls schauen Sie einfach bei www.mondverlauf.de oder einem vergleichbaren Mondkalender nach.

Neben den Phasen mit Neumond sind die Tage wichtig, an denen der Mond untergeht, bevor die Milchstraße am Himmel steht, oder erst aufgeht, wenn die Milchstraße bereits untergegangen ist. Nutzen können Sie auch die

Tage im Juni, Juli und August, an denen die Milchstraße die gesamte Nacht am Himmel steht, wenn dort der Mond erst in der zweiten Nachthälfte aufgeht oder bereits in der ersten Nachthälfte untergeht. In diesem Fall können Sie in der Zeit davor oder danach ebenfalls die Milchstraße fotografieren.

« Tabelle 5.1 Sichtbarkeit der Milchstraße, alle Zeitangaben in UTC

Für die MESZ addieren Sie +2 h und für die MEZ +1 h.

Suchen Sie daher genau nach den Zeiträumen, in denen zwar die Milchstraße, aber nicht der Mond am Nachthimmel steht. Eine dafür sehr gut geeignete Software ist www.stellarium.org. Mit dem kostenlosen Programm können Sie am Computer simulieren, wie der Nachthimmel an einem bestimmten Tag sein wird. Im Internet können Sie mithilfe der Uhrzeiten für den Mondaufgang und -untergang von www.mondverlauf.de abschätzen, ob Sie ein Zeitfenster zum Fotografieren haben.

Lichtverschmutzung

In dicht besiedelten Gebieten ist es nicht möglich, die Milchstraße zu fotografieren, da das Licht der Städte den Himmel erhellte, gleichermaßen wie das Mondlicht. Das von der Atmosphäre zurückgeworfene Licht übersteigt dann in seiner Intensität das Licht der Milchstraße.

Wenn Sie die Milchstraße erfolgreich fotografieren möchten, müssen Sie sich deshalb in Gebiete begeben, in denen keine Lichtquellen in der weiteren Umgebung zu Ihrem Standort zu finden sind. Dabei ist es nicht nur wichtig, dass die Umgebung Ihres Standorts absolut ohne Lichtquellen ist, sondern dass vor allem auch in Richtung der Milchstraße keine Gebiete mit hoher Lichtverschmutzung liegen.

Möchten Sie zum Beispiel die Milchstraße von einer Gegend nördlich von Frankfurt am Main aus fotografieren, finden Sie dort natürlich einen dunklen Standort. Jedoch erleuchtet die Stadt den Himmel so hell, dass der Blick auf die Milchstraße durch das Licht verhindert wird. Suchen Sie sich deshalb einen Ort aus, an dem etwa 100 km in Richtung der Milchstraße gemessen keine größeren Städte oder Dörfer liegen, sodass Sie ohne Probleme die Milchstraße fotografieren können.

⌘ 5.4 Lichtverschmutzung in Europa

Schwarz: keine, Rot: extrem

Diese Bedingung erfüllen in Deutschland nur wenige Gebiete. Besonders gut geeignet sind:

- Schwarzwald
- Pfälzerwald
- Eifel
- Hunsrück
- Rhön
- Harz
- Thüringer Wald
- Westhavelland
- lokale Bergmassive der Alpen

Bei der Suche nach einem Standort unterstützt Sie www.lichtverschmutzung.de. Dort finden Sie eine Karte der Lichtverschmutzung von Europa, sodass Sie genau erkennen können, welche Standorte sich zum Fotografieren eignen.

Beachten Sie gemäß Abbildung 5.3 die von der Jahreszeit abhängige Richtung, in der Sie die Milchstraße beobachten können. So können Sie einen geeigneten Standort suchen, von dem aus Sie in Richtung der Milchstraße einen Korridor geringer Lichtverschmutzung haben.

Für weniger Luftverschmutzung empfiehlt sich neben einem gebührenden Abstand zu großen Städten auch ein erhöhter Standort. Der meiste Schmutz bzw. Dunst in der Atmosphäre, der durch das Licht der Städte erhellt wird, befindet sich im unteren Teil der Atmosphäre, weshalb ein Standort in großer Höhe (wie ein Berggipfel) zu einer wesentlich klareren Fotografie der Milchstraße führt.

In Abbildung 5.4 sehen Sie deutlich die Lichtverschmutzung in Mitteleuropa. Diese Karte zeigt die Lichtverschmutzung beim senkrechten Betrachten des Himmels, das heißt, wenn Sie die Milchstraße über dem Horizont beobachten, müssen Sie darauf achten, dass der Himmel in dieser Richtung frei von starker Lichtverschmutzung ist.

Die Fotografie in Abbildung 5.5 zeigt die Milchstraße, aufgenommen im Pfälzerwald in Richtung Süden. Die starke Lichtverschmutzung entstammt dem 80 km südlich gelegenen Straßburg. Sie sehen, die Auswirkung ist selbst bei räumlich großem Abstand markant. Suchen Sie anhand der Karte der Lichtverschmutzung ein geeignetes Gebiet heraus, und wählen Sie ein Motiv als

Vordergrund für Ihre Fotografie. Verdeutlichen Sie sich mithilfe einer Landkarte, wie Sie Ihren Standort auf den Wetterprognosekarten wiederfinden.

⤴ 5.5 Lichtverschmutzung im Pfälzerwald durch die 80 km entfernt gelegene Stadt Straßburg
37 mm | f1,8 | 15 s | ISO 5000 | Raw | Stativ

Wolkenlosigkeit und geringer Dunst

Wenn Sie nun die Termine herausgefunden haben, an denen der Mond es zulässt, dass Sie die Milchstraße fotografieren können, muss der Himmel an diesem Termin natürlich frei von Wolken sein. Dabei ist nur die Blickrichtung von Ihrem Standort in Richtung der Milchstraße relevant. Die Höhe der Wolken über dem Boden ist auch

hier entscheidend, denn tiefe Wolken stehen für Sie als Beobachter bei gleichem Abstand wie hohe Wolken tiefer über dem Horizont. Sie sollten deshalb in Blickrichtung der Milchstraße keine hohen Wolken näher als 300 km, keine mittelhohen Wolken näher als 100 km und keine tiefen Wolken näher als 50 km sehen, da diese sonst zu hoch am Horizont stehen und den Blick auf die Milchstraße versperren würden.

Weiterhin sollte die Atmosphäre möglichst wenig Dunst enthalten, denn je mehr Dunst, desto stärker wird das Licht der Milchstraße von der Atmosphäre geschluckt, die Milchstraße wirkt kontrastarm und ist auf den Fotografien nicht gut zu sehen. Die Vorhersage von Dunst in der Atmosphäre ist ein schwieriges Unterfangen. Hierzu kann ich Ihnen keine Vorhersagemethode an die Hand geben – Sie müssen sich deshalb auf die Analyse des Ist-Zustands verlassen.

5.2 Vorhersage und Analyse der Bewölkung

Steht nun einer der möglichen Termine zum Fotografieren der Milchstraße an, müssen Sie sich vorab über die Bewölkungslage informieren.

Vorhersage

Verwenden Sie zwei bis drei Tage vor dem Termin die Bewölkungsprognosekarten. Ich empfehle das Mitteleuropa Super HD von www.kachelmannwetter.de, das WRF 4 km von www.modellzentrale.de oder das WRF Mitteleuropa von www.wetterzentrale.de.

Beginnen Sie mit den hohen Wolken, da diese am häufigsten stören. Danach folgen die mittelhohen Wolken und dann die tiefen Wolken. Da Sie aufgrund der Lichtverschmutzung nur bestimmte Standorte zum Fotografieren aufsuchen können, sollten Sie zunächst einen geeigneten Standort recherchiert haben und diesen auf den Wetterprognosekarten wiederfinden.

Wenn nun eine Nacht bevorsteht, in der kein Mond das Fotografieren der Milchstraße verhindert, können Sie für diese Nacht die entsprechenden Bewölkungsprognosekarten aufrufen. Betrachten Sie den kompletten Zeitraum ab dem Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang.

In Abbildung 5.6 sehen Sie die tiefen Wolken in der Karte Mitteleuropa Super HD von www.kachelmannwetter.de. Diese tiefen Wolken müssen einen Abstand von 50 km von Ihrer Location haben. Die mittelhohen Wolken einen Abstand von 100 km und die hohen Wolken 300 km. Überprüfen Sie dies mit den anderen Modellkarten.

Ihre Aufgabe bei der Vorhersage der Bewölkung ist es also, nach Lücken in der Bewölkung zu suchen, und

« 5.6 Tiefe Wolken des WRF-Modells von www.wetterzentrale.de um 21Z links und 00Z rechts

zwar in den Zeiträumen, in denen die Milchstraße am Himmel steht und zeitgleich kein störender Mond das Fotografieren verhindert. Beispielsweise müssten Sie Anfang April deshalb nur in der zweiten Nachthälfte nach einer Wolkenlücke suchen, da erst in diesem Zeitraum die Milchstraße zu sehen ist.

Zur Prognose des Dunstes in der Atmosphäre gibt es den Parameter »Stadt-Stink-Index«, der exklusiv in der Karte Mitteleuropa Super HD von www.kachelmannwetter.de zu finden ist. In Abbildung 5.7 sehen Sie den Parameter. Dieser zeigt die Schadstoffbelastung am Boden an – das ist ein guter Parameter zur Vorhersage des Dunstes. Stellen Sie sicher, dass der Wert für Ihre Location unter 20 bleibt, damit die Atmosphäre nicht zu dunstig ist.

5.7 Stadt-Stink-Index als Vorhersage des Dunstes in der Atmosphäre

www.kachelmannwetter.com

Analyse

Bevor Sie für die anstehende Nacht zum Fotografieren aufbrechen, analysieren Sie nun, ob Bewölkung und Sichtweite (für den Dunst) zum Fotografieren der Milchstraße und des Sternenhimmels geeignet sind, so wie Sie es den Prognosekarten entnommen haben.

Betrachten Sie hierzu etwa zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs das Satellitenbild. Sie können durch das restliche Licht des Tages auch das besser zu erkennende visuelle Satellitenbild verwenden. Suchen Sie Ihren Standort auf der Landkarte, und identifizieren Sie Wolkenfelder in Richtung der Milchstraße.

Berücksichtigen Sie auch, dass Sie innerhalb eines längeren Zeitraums nach Sonnenuntergang fotografieren werden. Sie müssen deshalb auch abschätzen, ob sich Wolkenfelder in die Richtung verlagern, in die Sie später fotografieren werden. Verwenden Sie hierzu die Animation des Satellitenbildes. Gute Satellitenbilder bieten www.sat24.com, www.kachelmannwetter.com und www.wetteronline.de für ganz Europa.

In Abbildung 5.8 sehen Sie das Infrarot-Satellitenbild in einer mondlosen Nacht mit sichtbarer Milchstraße. Es sind nur wenige Wolken über Deutschland zu sehen. In der Animation können Sie sich online anschauen, wie sich die Wolkenfelder verlagern. Schätzen Sie aus der Verlagerungsgeschwindigkeit ab, wie lange die Wolken bis zu dem Ort brauchen, an dem Sie fotografieren möchten. Dabei müssen die Wolken, in Richtung der Milchstraße betrachtet, den richtigen Abstand zu Ihrer Location haben, damit diese den Himmel nicht verdecken. Hohe Wolken sind weiß oder blau, mittelhohe Wolken sind grau gekennzeichnet.

Neben den aufziehenden hohen Wolken sehen Sie, dass die in den Prognosekarten von Abbildung 5.6 zu sehende Wolkenlücke bei Sonnenuntergang eine etwas andere Form und Position hat, als die Karten es gezeigt haben. Das ist vollkommen normal, Sie sollten deshalb immer kurz vor Sonnenuntergang anhand des visuellen Satellitenbildes überprüfen, wo sich eine etwaige, den Prognosekarten entnommene Wolkenlücke tatsächlich befindet und wie sich die Wolkenfelder um die Wolkenlücke herum verlagern. Nur wenn Sie auch hier erkennen, dass die auf dem Satellitenbild zu sehende Wolkenlücke dem entspricht, was Sie sich zum Fotografieren der Milchstraße in der darauffolgenden Nacht vorstellen, sollten Sie aufbrechen.

Diese letzte Kontrolle am Vorabend ist der Moment, an dem Sie final entscheiden, ob Sie aufbrechen oder lieber zu Hause zu bleiben. Nicht immer ist die Wolken-

lücke wie in diesem Fall schon bei Sonnenuntergang zu erkennen, manchmal reißt der Himmel erst bei Nacht auf.

Falls Sie den Wetterprognosekarten entnommen haben, dass sich erst in der Nacht eine Wolkenlücke zum Fotografieren bildet, müssen Sie abwarten und auch in der Nacht noch das Satellitenbild beobachten. Hier bietet vor allem www.wetteronline.de eine gute Lösung, denn auf dem speziellen Satellitenbild erkennt man auch die tiefen Wolken bei Nacht. Wenn Sie auf eine in den Wettermodellen prognostizierte Lücke in den tiefen Wolken warten, können Sie hier gut sehen, ob sie sich tatsächlich bildet. Da Sie auf diesem Satellitenbild jedoch nicht deutlich zwischen der Höhe der Wolken unterscheiden können, dient eine Kombination des Satellitenbildes von www.wetteronline.de und www.sat24.com dazu, die Situation der Bewölkung in der Nacht abzuschätzen, denn das Infrarot-Satellitenbild von www.sat24.com zeigt bei Nacht gut die Position von hohen und mittelhohen Wolkenfeldern.

Da den Wetterprognosekarten schwer zu entnehmen ist, welche **Sichtweite** an einem Tag vorliegen wird, um dadurch einen Eindruck vom Dunst in der Atmosphäre zu erhalten, müssen Sie diesen Zustand überprüfen, bevor

Sie zur Foto-Tour aufbrechen. Verwenden Sie hierzu die Daten der Wetterstationen von www.kachelmannwetter.com oder www.wetteronline.de.

Da die Wetterstationen die Sichtweite messen, indem sie überprüfen, wie viele Partikel wie Staub, Pollen und Wassertröpfchen am Ort der Wetterstation in der Luft umherschwirren, müssen Sie die Sichtweiten der Wetterstationen in unterschiedlichen Höhenlagen kontrollieren. Im besten Fall ist die Sichtweite in allen Höhenlagen gut – für gute Bedingungen zum Fotografieren sollte die Sichtweite in allen Höhenlagen wenigstens 50 km betragen.

Überprüfen Sie also an den verfügbaren Wetterstationen in der Umgebung Ihres geplanten Standortes, ob die Wetterstationen im Tal und in verschiedenen Höhenlagen eine entsprechend gute Sichtweite anzeigen.

- In den meisten Fällen ist die Sichtweite in der Höhe besser als im Tal.
- In wenigen seltenen Fällen kommt es zu Wetterlagen, in denen der Dunst in einer bodennahen Luftschicht gefangen ist. Es werden von tief gelegenen Wetterstationen sehr geringe Sichtweiten erreicht. In solchen Fällen müssen Sie sich in eine Höhenlage begeben, in der eine gute Sichtweite gemessen wird, denn so befinden Sie sich oberhalb des Dunstes.
- Noch seltener ist es, dass sich im Tal Nebel bildet, im besten Fall sogar dichter Bodennebel (siehe Kapitel 11, »Nebel«). Der Nebel schluckt perfekt das Licht der Städte und reduziert enorm die Lichtverschmutzung. Wenn die Wetterstationen im Tal Nebel melden, dann haben Sie beste Bedingungen, um in der Höhenlage die Milchstraße zu fotografieren.

In Abbildung 5.9 sehen Sie die Sichtweite einer Nacht, in der es gute Bedingungen zum Fotografieren der Milchstraße gegeben hat. Wie Sie sehen, liegt die Sichtweite verbreitet bei 70 km; dies ist der höchste zu erreichende Wert der Wetterstationen.

« 5.8 Infrarot-Satellitenbild von www.sat24.com mit Wolkenlücke in den tiefen Wolken über Baden-Württemberg und freiem Blick nach Süden

Ich empfehle Ihnen, bevor Sie zum Fotografieren aufbrechen, noch einen letzten Check der Wetterlage. So können Sie sicher sein, dass sich nicht spontan Wolken ausbilden, und können beruhigt zum Fotografieren losfahren. Gerade bei einer Wetterlage, bei der Sie auf eine zeitweise Lücke in der Bewölkung gesetzt haben, sollten Sie unbedingt auf dem Satellitenbild im Auge behalten, ob sich die Lücke nicht plötzlich schließt.

5.9 Sichtweitemeldungen der Wetterstationen, Angaben in km

www.kachelmannwetter.com

5.3 Besonderheiten der Fotografie des Nachthimmels

Das Fotografieren bei Nacht stellt seit jeher besondere Anforderungen – an den Fotografen und sein Equipment. Es ist wichtig, sich alle Besonderheiten und Herausforderungen vor Augen zu führen, denn nur so ist es möglich, erfolgreich in absoluter Dunkelheit zu fotografieren.

Rotationsproblematik

Nach der Lichtverschmutzung, die Sie durch gezieltes Auswählen der Location vermeiden können, ist das größte Hindernis beim Fotografieren der sich durch die Erdrotation »bewegende« Nachthimmel bei einem zeitgleich sehr lichtschwachen Motiv. Wäre das nicht so, könnte man einfach die Kamera auf dem Stativ befestigen und so durch eine extrem lange Belichtungszeit die Milchstraße sichtbar machen. Das funktioniert jedoch nicht. Sie werden immer dem Problem gegenüberstehen, dass abhängig von der gewählten Brennweite die Sterne durch die lange Belichtungszeit zu Strichen verwischen, wie in Abbildung 5.10 zu sehen.

5.10 100%-Ausschnitt einer Fotografie mit Strichspuren der Sterne durch eine lange Belichtungszeit

15 mm | f2,8 | 271 s | ISO 4000 | Raw | Stativ |
100%-Ausschnitt aus Originalfoto

Um diesen Effekt zu vermeiden, müssen Sie eine entsprechend kurze Belichtungszeit wählen. Bei einer Brennweite von 15 mm dürfen Sie maximal 30 s lang belichten, bei 50 mm sind es nur noch 10 s.

Dies wäre nicht so schlimm, wäre die Milchstraße nicht extrem lichtschwach. Um eine verhältnismäßig gut belichtete Aufnahme zu erhalten und zeitgleich eine solche kurze Belichtungszeit zu erreichen, müssen Sie die Kamera deshalb extrem lichtempfindlich einstellen. Sie benötigen eine Kamera, deren Bildsensor bei ISO-Werten im Bereich von 3200 und höher noch eine brauchbare Bildqualität mit geringem Rauschen erzeugt. Weiterhin sollten Sie diese Kamera mit einem lichtstarken Objektiv

bestücken. Für die normale Landschaftsfotografie reicht eine Brennweite von maximal 50 mm aus. Offenblenden von $f2,8$ oder besser sind in jedem Fall Pflicht.

Kameraeinstellungen

Wenn Sie im Weitwinkelbereich bis maximal 20 mm arbeiten, reicht es aus, wenn Sie über ein Objektiv mit Offenblende von $f2,8$ verfügen. Diese sollten Sie in jedem Fall einstellen, um viel Licht einzufangen zu können. Einen Nachteil durch zu geringe Schärfentiefe gibt es nicht, da selbstverständlich alle Sterne für das Objektiv im Unendlichen liegen. Beachten Sie aber, dass die Kontrastschärfe bei Offenblende selten optimal ist. Zudem sollten Sie sich einen Vordergrund suchen, der weiter entfernt als etwa 20 m ist, da die fehlende Schärfentiefe diesen sonst unscharf werden lässt, wie Sie in Abbildung 5.1 sehen.

Den ISO-Wert sollten Sie bei dieser Blende auf 3.200 einstellen, bei einer Belichtungszeit von 30 s. Sie werden in diesem Fall leichte Strichspuren der Sterne erhalten, wie Sie dem 100%-Ausschnitt in Abbildung 5.10 entnehmen können. Damit diese verschwinden, müssen Sie die Belichtungszeit auf 20 s reduzieren, einen entsprechenden Verlust in der Helligkeit müssen Sie durch einen höheren ISO-Wert ausgleichen. Ich empfehle deshalb, nur

↗ **5.11 Strichspuren nach 20 s Belichtung bei 20 mm Brennweite**

Minimale Strichspuren durch eine kurze Belichtungszeit

20 mm | $f1,4$ | 20 s | ISO 6400 | Raw | Stativ | 100%-Ausschnitt aus Originalfoto

Kameras zu verwenden, die bei solchen Werten noch eine gute Bildqualität erzeugen.

Eine besonders schöne Brennweite für die Milchstraße sind 50 mm, denn in diesem Brennweitenbereich gibt es sehr lichtstarke Objektive mit $f1,8$, $f1,4$ oder gar $f1,2$. Wenn Sie diese auf Offenblende einstellen, können Sie bei ISO 3200 und einer Belichtungszeit von 10 s eine gut belichtete Milchstraße erhalten, bei der man trotz dieser vergleichsweise langen Brennweite die Strichspuren der Sterne kaum sieht. Mit immer lichtempfindlicheren Bildsensoren kann in Zukunft die Belichtungszeit sicher noch weiter reduziert werden, sodass auch größere Brennweiten ohne das Ausbilden von Strichspuren verwendet werden können.

Bildbearbeitung

Eine wichtige Technik der digitalen Bildbearbeitung bei Aufnahmen der Milchstraße ist das Ersetzen des Vordergrunds. Wenn Sie die Milchstraße mit den zuvor genannten Einstellungen fotografieren, haben Sie das Problem, dass der Vordergrund extrem verrauscht, meistens zu dunkel und vor allem farblos ist. Damit Sie nicht mit diesem Problem leben müssen, sollten Sie immer mit zwei Belichtungen arbeiten:

- Sie fotografieren zunächst die Milchstraße.
- Dann fotografieren Sie den Vordergrund.

Da sich der Vordergrund (meistens) nicht wegbewegt, können Sie hier die offene Blende und den hohen ISO-Wert gegen eine wesentlich längere Belichtungszeit eintauschen. Fertigen Sie deshalb eine weitere Belichtung für den Vordergrund an. Reduzieren Sie den ISO-Wert auf einen vertretbaren Wert (üblich: 1600 oder niedriger), und erhöhen Sie zum Reduzieren der störenden Vignettierung in den Ecken die Blendenzahl etwas. Nun fotografieren Sie mit einer Belichtungszeit, die diejenige der vorausgehenden Aufnahme der Milchstraße bei Weitem übersteigt. Belichten Sie so, dass der Vordergrund nicht mehr unterbelichtet ist.

Im Anschluss daran können Sie so einen klaren, farbigen und wenig verrauschten Vordergrund in die Fotografie mit der Milchstraße einfügen.

Ausrüstung

Wenn Sie die Milchstraße regelmäßig fotografieren möchten, lohnt sich die Investition in eine sogenannte **Nachführung**. Diese Nachführung wird zwischen Stativ und Kamera angebracht und lässt die Kamera auf dem Stativ mit exakt der Rotationsgeschwindigkeit der Erde rotieren. Dadurch können Sie mit einer langen Belichtungszeit arbeiten, ohne Strichspuren zu erhalten. Sie können deshalb den ISO-Wert unten lassen und die Blendenzahl erhöhen, sodass Sie mehr Kontrastschärfe und weniger Bildfehler erhalten.

In diesem Fall müssen Sie nur bedenken, dass Ihr Vordergrund in der Fotografie verwischen wird, da die Kamera rotiert. Daher müssen Sie mit zwei Belichtungen arbeiten, einmal für die Milchstraße mit laufender Nachführung und einmal für den Vordergrund mit ausgeschalteter Nachführung.

Eine Nachführung eignet sich natürlich auch für die Astrofotografie im engeren Sinn, um mit dem Teleobjektiv gezielte Aufnahmen von Himmelskörpern zu machen. Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, sollten Sie sich zusätzlich das Buch »Astrofotografie« ansehen, ebenfalls im Rheinwerk Verlag erschienen.

Weißabgleich und Farbe

Eine besondere Herausforderung bei der Fotografie gen Nachthimmel ist der Weißabgleich, denn mit unseren Augen sehen wir die Milchstraße rein farblos. An dieser Stelle muss man deshalb ein wenig überlegen. Im Weltall gibt es keine Atmosphäre, das heißt, zwischen den Sternen ist normalerweise nichts. Das hat zur Folge, dass aus dem Raum zwischen den Sternen auch kein Licht zur Erde gelangt, es gibt also Sterne und sonst ist alles schwarz. Das, was in der Nacht zwischen den Sternen an Licht zur Kamera gelangt, ist das Streulicht der Lichtverschmutzung aus der Erdatmosphäre, und das ist in der Regel bei 3.500 Kelvin farbneutral, da es hauptsächlich von Glühlampen stammt. Stellen Sie Ihre Kamera deshalb auf diesen Weißabgleich ein.

Auf meinen Fotografien sehen Sie, dass ich diese immer etwas ins Blaulilafarbene verfremde – das ist mein ganz persönlicher Geschmack. Fühlen Sie sich frei, Ihre

eigene Farbinterpretation des Nachthimmels zu finden; erschaffen Sie die Bilder, die Ihnen gefallen.

Weiterhin ist der sichtbare leuchtende Streifen, also die Milchstraße, eine Ansammlung von Sternen. Dieses Licht hat Ähnlichkeit mit dem Licht der Sonne mit einer Farbtemperatur von etwa 5.500 Kelvin bei Mittagssonne. Deshalb sieht die Milchstraße immer etwas gelblich aus, da sie eine andere Farbtemperatur hat. Rein theoretisch ist jedoch auch die Farbinterpretation der Milchstraße Geschmackssache, da man die Farben mit dem menschlichen Auge sowieso nicht sehen kann.

Milchstraße und Dämmerung

Sie können die Milchstraße auch dann fotografieren, wenn sich etwas Dämmerlicht am Horizont befindet. In diesem Fall geben Sie der Fotografie einen besonderen Charme, da sehr blaues Licht aufgrund der Blauen Stunde einfällt.

Sie können dieses Licht gut nutzen, um den Vordergrund der entstehenden Fotografie leichter aufzuhellen. Besonders in den Sommermonaten ist dies gut möglich, denn die Milchstraße geht im Südosten auf, während aus Nordwesten das restliche Dämmerlicht einfällt. Bei Sonnenaufgang steht die Milchstraße dann im Südwesten, und das Dämmerlicht kommt aus Nordosten. In Abbildung 5.13 sehen Sie ein Panorama, in dem das erste Dämmerlicht am Horizont zu sehen ist. Wählen Sie den Zeitpunkt also nach Möglichkeit so, dass Sie diese Lichtsituation fotografieren können.

Orientierung bei Nacht

Beim Fotografieren müssen Sie sich natürlich im Dunkeln orientieren können. Bevor Sie sich auf eine Tour zu Ihrem Motiv begeben, sollten Sie sich den Weg dorthin bewusst machen und bedenken, dass Sie im Dunkeln keine Orientierung haben werden. Selbst wenn Sie einen Ort im Hellen bereits kennen, wird er Ihnen bei Dunkelheit komplett fremd vorkommen, und Sie können sich schnell verlaufen.

Ich empfehle Ihnen deshalb, sich mit einem GPS-Wandernavigationssystem auszustatten. Hier gibt es die Mög-

lichkeit, ein eigenständiges System zu kaufen oder eine App für Ihr Smartphone zu verwenden.

Eine weitere Möglichkeit ist es, in der Abenddämmerung zu Ihrem Standort zu wandern und mit der Morgendämmerung zurückzukehren. Gerade in den Hochsommernächten ist es nur wenige Stunden dunkel, und diese werden Sie mit Sicherheit durchfotografieren.

Auch benötigen Sie einen Kompass oder eine entsprechende App auf Ihrem Smartphone, um zu wissen, in welcher Richtung die Milchstraße am Himmel steht. Erst nach einiger Zeit gewöhnen sich Ihre Augen ausreichend an die Dunkelheit, sodass Sie das feine Band der Milchstraße auch mit bloßem Auge erahnen können.

Fokussieren im Dunkeln

Die größte Herausforderung beim Fotografieren der Milchstraße ist es, den richtigen Fokus einzustellen, sofern Sie nicht über eine Festbrennweite verfügen, bei der man am Fokusring des Objektivs einfach auf unendlich drehen kann.

Bei einem Zoomobjektiv ist diese Ferneinstellung auf unendlich nicht bei jeder Brennweite gleich und zudem schwierig zu merken. Der einfachste Trick ist, mit dem Autofokus durch den Sucher hindurch auf sehr weit entfernte, leuchtende Objekte zu fokussieren. Sind diese markant genug, klappt das auch. In Mitteleuropa hat man in der Regel immer irgendein Windrad, einen Funkmast o. Ä. in der näheren Umgebung mit Licht, sodass Sie darauf fokussieren können und anschließend die Kamera zur Milchstraße richten. Vergessen Sie nicht, den Autofokus nach dem Fokussieren auszuschalten, sonst versucht die Kamera eigenständig, auf den Sternenhimmel scharf zu stellen, schafft es nicht, und das Foto wird unscharf.

» **5.12 Durch Taschenlampe zum Fokussieren erhellter Vordergrund**

15 mm | f2,8 | 59 s | ISO 6400 | Raw | Stativ, Nachführung

TIPP: BILDSCHIRMHELLIGKEIT

Denken Sie daran, dass Sie bei Nacht unbedingt die Helligkeit Ihres Kamerabildschirms auf die niedrigste Stufe einstellen! Nicht nur, dass Sie sich immer wieder durch einen zu hellen Bildschirm selbst blenden. Sie bekommen auch einen falschen Eindruck von der Helligkeit der entstandenen Fotografie und könnten denken, dass Sie Ihr Foto passend belichtet haben, obwohl es eigentlich unterbelichtet ist.

⤴ 5.13 Milchstraße Anfang April

Durch eine Panoramaaufnahme wirkt sie wie ein Bogen; links im Bild ist das erste Licht der Morgendämmerung zu sehen, und rechts ist der Himmel orangefarben durch künstliches Licht verschmutzt.

18 mm | f2,8 | 30 s | ISO 10000 | Raw | Stativ, Panorama aus acht Hochformataufnahmen

Wenn Sie eine Kamera mit guten High-ISO-Fähigkeiten sowie ein lichtstarkes Objektiv besitzen, dann können Sie mithilfe des Livebild-Modus auf einzelne helle Sterne fokussieren. Schalten Sie hierzu auf den manuellen Fokus an Ihrem Objektiv und nutzen Sie, so vorhanden, die Lupenfunktion im Livebild-Modus, mit der Sie das Livebild auf einen engeren Ausschnitt begrenzen können. Mit dieser Funktion können Sie einen einzelnen sehr hellen Stern vergrößern. Wenn Sie nun am Fokusring Ihres Objektivs drehen, sehen Sie, wie der Stern mal größer und mal kleiner wird. Je kleiner der als weißer Lichtfleck vor schwarzem Hintergrund zu erkennende Stern ist, desto schärfer ist das Objektiv eingestellt. Suchen Sie den Punkt, an dem der Stern nicht mehr kleiner wird: Sie haben nun auf unendlich fokussiert.

Versagen all diese Möglichkeiten, dann sollten Sie eine starke Lichtquelle mit sich führen. Es gibt Taschenlampen mit extrem großer Leuchtkraft. Sie eignen sich dazu, Objekte anzustrahlen, sodass Sie bei Nacht ganz gewöhnlich den Autofokus durch den Sucher verwenden können. Suchen Sie sich hierzu ein Objekt aus, das etwa 50 m oder weiter von Ihrem Standort entfernt ist. Platzieren Sie die Taschenlampe vor dem Objekt, sodass das Objekt durch die Taschenlampe direkt angestrahlt wird. Nun können Sie bequem auf das erleuchtete Objekt durch den Sucher hindurch fokussieren.

Diese Methoden sind durchaus ziemlich arbeits- und zeitaufwendig, Sie müssen jedoch nur einmal so vorgehen, es sei denn, Sie ändern an Ihrem Zoomobjektiv die Brennweite. Bei den meisten Objektiven kommt es in diesem Fall zu einer minimalen Abweichung des Fokus. In Abbildung 5.12 sehen Sie symbolisch, wie der Vordergrund zum Fokussieren durch eine Taschenlampe aufgehellt wird.

Vordergrundmotive für einen Sternenhimmel

Ihre Wahl eines Vordergrundmotivs für Ihr Milchstraßenfoto wird durch folgende Faktoren eingeschränkt:

- Lichtverschmutzung
- etwas erhöhter räumlicher Abstand von der Kamera wegen der Schärfentiefe

- Brennweitenbereich < 50 mm
- Bewegung darf dem Motiv nicht schaden

Es bietet sich daher an, vor allem weiter entfernte und große Objekte, die sich markant abheben, in den Vordergrund zu nehmen. Da die Milchstraße im Foto stark betont sein wird, sollten Sie ähnlich ausdrucksstarke Objekte für den Vordergrund auswählen, sonst wirkt er bei Nacht langweilig. Vor allem das fehlende Licht lässt den Vordergrund kontrastarm erscheinen, sodass Sie sich auf markant geformte Objekte konzentrieren müssen, so wie in Abbildung 5.15 die hellen Berge.

Ihre Motive für den Vordergrund sind auf den Südosten bis Südwesten beschränkt. Beachten Sie für Mitteleuropa unbedingt Abbildung 5.3, denn Sie können nur während weniger Monate die Milchstraße in eine bestimmte Himmelsrichtung fotografieren.

Betrachten Sie abschließend Abbildung 5.14: Sie haben Ihrem Repertoire an Hintergründen für Landschaftsfotografien nun sprichwörtlich neue Himmelsrichtungen hinzugefügt.

⚡ 5.14 Himmelsrichtungen und mögliche Wetterphänomene als Hintergrund am Himmel

⤴ 5.15 Milchstraße über markanten Bergen als Motiv für den Vordergrund

30 mm | *f*2,8 | 20s | ISO 8000 | Raw | Stativ

Inhalt

Einleitung	14
------------------	----

1 EINFÜHRUNG IN DIE WETTERVORHERSAGE

32

1.1 Datum und Uhrzeit des Wetters	32
Koordinierte Weltzeit	32
Zeitangaben verstehen	32
1.2 Die Grundelemente des Wettergeschehens	33
Wolken	33
Fronten	37
1.3 Die Vorhersage: Wetterkarten lesen lernen	39
Die Bewölkung	41
Der Niederschlag	42
Die Temperatur	43
Die relative Luftfeuchtigkeit	45
Der Wind	46
Der Luftdruck, das Hoch und das Tief	47
Die potentielle Äquivalenttemperatur	49
1.4 Zur Treffsicherheit von Wettermodellen	50
1.5 Aktuelles Wetter	51
Das Niederschlagsradar	51
Das Satellitenbild	53
Wetterstationen	55
Webcams	58
EXKURS Der gezielte Einsatz von Webcams führt zum Erfolg	60

2 DAS MOTIV UND DAS WETTER

66

2.1 Das Morgen- und Abendrot	66
2.2 Nebel	73
2.3 Schnee und Raureif	77

2.4	Sonne und Mond	79
2.5	Sternenhimmel	81
2.6	Blaue Stunde	81
2.7	Gewitter	83
2.8	Motive zum Wetter finden	87
	500 px, Flickr, Fotocommunity und Co.	87
	Das Wetter einplanen	88
2.9	Wetter und Fotoreisen	89
3	ABENDROT UND MORGENROT	94
3.1	Ursache und Entstehung von Himmelsröte	94
	Erste Bedingung: Wolken!	96
	Zweite Bedingung: Freier Lichtweg	97
	Dritte Bedingung: Richtige horizontale Ausdehnung des Wolkenfeldes	99
	Zeitlicher Ablauf der Himmelsröte	101
	Zweimal Morgenrot und Abendrot an hohen Wolken	102
3.2	Visuelles Erkennen eines sich anbahnenden Abendrots/Morgenrots	103
	Abendröte	103
	EXKURS Abendrot/Morgenrot am Himmelsbild deuten	104
	Morgenröte	107
3.3	Arbeiten mit dem Satellitenbild	107
	Wolkenhöhe auf dem visuellen Satellitenbild	107
	Wolkenhöhe auf dem Infrarot-Satellitenbild	109
	Zugrichtung und Zuggeschwindigkeit	109
	Für Abendrot und Morgenrot passende Wolkenkonstellationen erkennen	109
	Größe der Wolkenlücke	114
	Checkliste: Himmelsrot per Satellitenbild erkennen	114
3.4	Längerfristige Vorhersage mithilfe von Wettermodellen ...	115
	Fronten und Himmelsröte	115

	Fronten auf den Karten 850 hPa potentielle Äquivalenttemperatur erkennen	118
	Wolkenfelder auf den Bewölkungskarten	119
3.5	Fotografische Bedingungen während des Himmelsrots	120
	Lichtintensität und Belichtungszeit	120
	Überbelichteter Himmel, unterbelichteter Vordergrund	120
	Überbelichtung des Rotkanals	121
	Planung der Himmelsrichtung	121
	EXKURS Praktische Tipps für die Vorhersage von Himmelsrot	122
4	BLAUE STUNDE	128
4.1	Theorie	128
	Bedingung für die Blaue Stunde: Wolkenlosigkeit	129
	Lichtverlauf während der Dämmerung	129
4.2	Weitere Phänomene der Dämmerung	130
	Gegendämmerung	130
	Erdschatten	130
	Orangefarbener Horizontalstreifen	130
	Dämmerungsstrahlen	130
4.3	Vorhersage und Analyse	133
4.4	In der Dämmerung fotografieren	134
	Farbe am Himmel	135
	Lichtgleiche	135
	Langzeitbelichtung ohne Filter	138
	Sterne am blauen Himmel	139
5	MILCHSTRASSE UND STERNENHIMMEL	142
5.1	Die optimalen Bedingungen	142
	Zeit und Ort für die optimale Fotografie	142
	Mond und Sternenhimmel	146

Lichtverschmutzung	147
Wolkenlosigkeit und geringer Dunst	148
5.2 Vorhersage und Analyse der Bewölkung	149
Vorhersage	149
Analyse	150
5.3 Besonderheiten der Fotografie des Nachthimmels	152
Rotationsproblematik	152
Kameraeinstellungen	153
Bildbearbeitung	153
Ausrüstung	154
Weißabgleich und Farbe	154
Milchstraße und Dämmerung	154
Orientierung bei Nacht	154
Fokussieren im Dunkeln	155
Vordergrundmotive für einen Sternenhimmel	158
6 STERNSCHNUPPEN	162
6.1 Die optimalen Bedingungen	162
Sternschnuppenschauer: wie, wo und wann?	162
Lichtverschmutzung	164
Mond	164
6.2 Vorhersage	164
6.3 Besonderheiten bei der Fotografie von Sternschnuppen	169
Ausrichtung der Kamera	169
Die Vordergrundmotive	169
Fotomontage	170
7 LEUCHTENDE NACHTWOLKEN ...	174
7.1 Die optimalen Bedingungen	174
Jahreszeit und Ort	174
Tageszeit	176
Das Wetter	178

7.2	Vorhersage und Analyse	178
	Die Wetterprognose	180
	Das Satellitenbild	181
	Webcams	182
7.3	Besonderheiten der Fotografie von leuchtenden Nachtwolken	183
	Das Auftreten von leuchtenden Nachtwolken	183
	Kameraeinstellungen	184
	Das Motiv	184
8	POLARLICHTER	188
8.1	Theorie und Vorhersage	188
	Alles beginnt auf der Sonne	188
	Die Himmelsrichtung	192
	Störendes Licht	193
	Das Wetter	193
8.2	Analyse	194
	Webcams	195
	Wolkenanalyse	195
8.3	Besonderheiten der Fotografie von Polarlichtern	196
	Kameraeinstellungen	196
	Motive	196
9	SONNE UND MOND	202
9.1	Die optimalen Bedingungen	202
	Mondaufgang und -untergang	203
	Sonne und Mond im Detail	205
	»Blutsonne«	207
	Alpenglühfen	208
	Mondlicht bei Nacht	210
9.2	Vorhersage	211
9.3	Analyse	212
	Satellitenbilder	212
	Sichtweiten	213

10	EIS UND SCHNEE	218
10.1	Die optimalen Bedingungen	218
	Die perfekte Schneelandschaft	218
	Gefrorene Seen	221
	Gefrorene Wasserfälle	222
10.2	Vorhersage Schnee	222
	Die Neuschneesummenkarte	224
	Die Temperatur	225
	10-m-Wind	226
	Die Bewölkung	226
10.3	Vorhersage von gefrorenen Seen	227
	500 hPa Geopotential und Bodendruck	227
	EXKURS Vorhersageroutine für Schneefall	228
	2-m-Temperatur	229
10.4	Vorhersage von gefrorenen Wasserfällen	230
10.5	Analyse der Schneesituation	230
10.6	Analyse der Eisbildung	232
10.7	Ausrüstung	232
10.8	Besonderheiten bei der Fotografie von Eis und Schnee ...	233
	Polfilter	233
	Kleine Holzbrettchen	233
	Das richtige Stativ	233
11	NEBEL	236
11.1	Ursache und Entstehung von Nebel	236
	Nebelschleier	236
	Dichter Bodennebel	238
	Hochnebel	240
	Staunebel im Gebirge	241
	Dampfende Gewässer	242
11.2	Vorhersage der verschiedenen Nebelarten	243
	Vorhersage Nebelschleier	243

Vorhersage dichter Bodennebel	245
Vorhersage Hochnebel	248
Vorhersage Staunebel im Gebirge	251
Vorhersage dampfende Gewässer	252
11.3 Analysewerkzeuge	253
Wetterstationen	253
EXKURS Arbeitsroutine zur Vorhersage	254
Webcams	255
Satellitenbild	255
EXKURS Nebelvorhersage vor Ort	257
11.4 Analyse des aktuellen Zustands	258
Analyse Nebelschleier	258
Analyse dichter Bodennebel	259
Analyse Hochnebel	261
Analyse Staunebel im Gebirge	262
Analyse dampfende Gewässer	263
11.5 Einsatz am Motiv	264
Nebelschleier	264
EXKURS Nebelprognose im Schnellcheck	266
Dichter Bodennebel	268
Hochnebel und Staunebel	270
Dampfende Gewässer	270
Nebelstrahlen	271
12 RAUREIF	278
12.1 Bedingungen für Raureif	278
12.2 Vorhersage	282
12.3 Analyse	283
Wetterstationen	283
Satellitenbild	286
Webcams	287
12.4 Besonderheiten der Fotografie von Raureif	287

13	GEWITTER	290
13.1	Theorie: Gewitterzelle und Gewittersystem	291
	Einzelzelle	291
	Multizelle	294
	Superzelle	295
	Gewittersysteme	296
13.2	Wie entstehen Gewitter?	297
	Energie	297
	Hebung	299
	Dynamik	300
13.3	Gewittervorhersage	301
	CAPE	301
	Niederschlag	302
	Wind	304
	Spread	306
	Simulierte Radarreflektivität	307
	Spezielle Websites	308
13.4	Gewitteranalyse	309
	Blitzortung	309
	Niederschlagsradar	311
13.5	Stormchasing: Die Jagd nach dem Gewitter	315
	Position und Wolkenstrukturen	315
	Ideale Positionierung	318
	Das richtige Navigationssystem	319
	Abgleich von Niederschlagsradar und Blitzortung mit dem Navigationssystem	320
	Die Lage im Auge behalten	321
	Bevor es losgeht	322
13.6	Fotografie: Ausrüstung	323
	Die Objektive	323
	Die Filter	324
	Das Stativ	324
	Die Pflege	324

13.7 Besonderheiten der Fotografie von Gewittern	325
Gewitter am Tag	325
Gewitter bei Nacht: Blitze	326
Gewitter bei Nacht: Wetterleuchten	328
Gewitter in der Dämmerung	330
13.8 Der Umgang mit der Gefahr	332
14 EIN WETTER KOMMT SELTEN ALLEIN	336
14.1 Die Jahreszeiten der Wetterphänomene	336
14.2 Arbeitsroutine	338
Betrachtung der Bedingungen	339
Motive und Wetterprognose	339
Analyse des Ist-Zustands	340
14.3 Wetterphänomene in Kombination	341
Nebel und Blaue Stunde	342
Schnee und Raureif	342
Schnee und Blaue Stunde	343
Gewitter und Blaue Stunde	343
Schnee und Nebel	343
Morgenröte und Schnee	346
Gewitter und Sternenhimmel	346
Milchstraße und Nebel	346
Nebel und Himmelsrot	346
Index	350